

EL NIÑO/OSCILACIÓN DEL SUR (ENSO por sus siglas en inglés) DISCUSIÓN DIAGNÓSTICA

emitida por
CENTRO DE PREDICCIONES CLIMÁTICAS/NCEP/NWS
y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad
Traducción cortesía de: **WFO SAN JUAN, PUERTO RICO**
8 de mayo de 2014

Estatus del Sistema de alerta del ENSO: Vigilancia de El Niño

Sinopsis: La probabilidad de El Niño aumentará durante el resto del año, excediendo 65% para el verano.

ENSO-neutral continuó durante abril de 2014, pero con temperaturas de la superficie oceánica (SST, por sus siglas en inglés) sobre el promedio desarrollándose sobre gran parte del este del Océano Pacífico tropical al igual que cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha (Fig. 1). Las observaciones semanales de los índices de SSTs estuvieron cerca a ligeramente sobre el promedio y aumentando en las regiones del Niño1+2, Niño3 y Niño3.4 y sobre el promedio en la región del Niño4 (Fig. 2). La fase descendente de la fuerte onda oceánica Kelvin que comenzó en enero, aumentó significativamente el contenido calórico oceánico durante marzo y abril (Fig. 3) y produjo anomalías positivas amplias en la temperatura de la subsuperficie a través del centro y este del Pacífico (Fig. 4). La porción superior de estas anomalías en la subsuperficie alcanzaron la superficie del océano, aumentando la temperatura del agua al este de la longitud 125°W. Además, durante el mes de abril, se observaron anomalías débiles en los vientos del oeste de los niveles bajos lejos en el oeste del Pacífico, mientras que se registraron anomalías en los vientos del este en las altas capas sobre la mayor parte del Pacífico. La convección aumentó sobre el oeste-central de Pacífico ecuatorial (Fig. 5). Estas condiciones atmosféricas y oceánicas reflejan colectivamente una continuada evolución hacia El Niño.

Los modelos de predicción de ENSO para este verano y luego del verano están indicando un aumento muy probable de El Niño este año comparado con el mes pasado. La mayoría de los modelos indican que el ENSO-neutral (índice de Niño-3.4 entre -0.5°C y 0.5°C) persistirá durante parte del resto de la primavera 2014 del Hemisferio Norte (Fig. 6), con una transición hacia El Niño durante el verano. Permanece la incertidumbre acerca de si El Niño se desarrollará y mayor aún sobre cuán fuerte sería. Esta incertidumbre esta relacionada a la falta intrínseca de destreza en los modelos para pronósticos realizados durante la primavera. Aunque ENSO-neutral está favorecida para la primavera del Hemisferio Norte, las probabilidades de El Niño aumentan durante el resto del año, y exceden el 65% para el verano (oprima [CPC/IRI consensus forecast](#) para las probabilidades de cada resultado).

Esta discusión es un esfuerzo consolidado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), el Servicio Nacional de Meteorología de NOAA y sus instituciones afiliadas. Las condiciones oceánicas y atmosféricas son actualizadas semanalmente en la página de Internet del Centro de Predicciones Climáticas ([Condiciones actuales de El Niño/La Niña y La Discusión de Expertos](#)). Los pronósticos para la evolución de El Niño/La Niña son actualizados mensualmente en la sección [Foro de Pronóstico](#) del Boletín de Diagnóstico Climático del Centro de Predicciones Climáticas (CPC por sus siglas en inglés). La próxima Discusión Diagnóstica del ENSO está programada para el 5 de junio de 2014. Para recibir una notificación por e-mail al momento en que la Discusión Diagnóstica del ENSO mensual esté disponible, favor enviar un mensaje a: ncep.list.ens0-update@noaa.gov.

Centro de Predicciones Climáticas
Centros Nacionales de Predicción Ambiental
NOAA / Servicio Nacional de Meteorología
College Park, MD 20740




Figura 1. Anomalías (°C) promedio de la temperatura de la superficie del mar (SST, por sus siglas en inglés) para la semana centrada el 30 de abril de 2014. Las anomalías son calculadas utilizando como referencia base los periodos promedio semanales de 1981-2010.




Figura 2. Series de Tiempo de las anomalías (en °C) de temperaturas de la superficie del mar (SST) en un área promediada en las regiones de El Niño [Niño-1+2 (0°-10°S, 90°W-80°W), Niño 3 (5°N-5°S, 150°W-90°W), Niño-3.4 (5°N-5°S, 170°W-120°W), Niño-4 (150°W-160°E y 5°N-5°S)]. Las anomalías de SST son variaciones de los promedios semanales del período base de 1981-2010.




Figura 3. Anomalías del contenido calórico (en °C) en un área promediada del Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°-100°W). Las anomalías en el contenido calórico son calculadas como las desviaciones de los penta-promedios del período base de 1981-2010.




Figura 4. Anomalías de la temperatura (en °C) en un sector de profundidad-longitudinal (0-300m) en la parte superior del océano Pacífico ecuatorial, centradas en la semana de 28 de abril de 2014. Las anomalías son promediadas entre 5°N-5°S. Las anomalías son variaciones de los promedios semanales del período base de 1981-2010.




Figura 5. Anomalías de la radiación emitida de onda larga promedio (OLR, por sus siglas en inglés) (W/m^2) para el período de 3 -28 de abril de 2014. Las anomalías de OLR se calculan como desviaciones de los penta-promedios del período de 1979-1995.

Mid-Apr 2014 Plume of Model ENSO Predictions




Figura 6. Pronósticos de las anomalías de la temperatura de la superficie del océano (SST) para la región de El Niño 3.4 (5°N-5°S, 120°W-170°W). Figura actualizada el 16 de abril de 2014.